

¿Cómo podemos ser útiles si tenemos algún familiar o amigo con TUBERCULOSIS?

- 1 Debemos ventilar la casa y dejar que entre el Sol.




- 2 El paciente debe cubrirse la boca con un pañuelo al toser o estornudar, y botar la flema en un papel para descartarlo de inmediato.

- 3 Apoyemos al enfermo. Si él está en tratamiento ya no contagia.



- 4 No permitamos que abandone su tratamiento. Si lo hace, las cosas empeorarán para todos.



**Recuerda:
El tratamiento
de TB
es gratuito**

Para mayor información llama a Infosalud:

0800-10-828 Línea gratuita a nivel nacional
o ingresa a : www.minsa.gob.pe



Cerrando Brechas: Hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en VIH/SIDA y TB en el Perú. Propuesta con Enfoque de Descentralización Multisectorial Participativa.



PERÚ

Ministerio de Salud

LO QUE DEBEMOS SABER SOBRE LA

TB



Apoyado por:




Invirtiendo en nuestro futuro
El Fondo Mundial
De lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria

**La Tuberculosis SE PUEDE CURAR...
LA DISCRIMINACIÓN TAMBIÉN**

1 ¿Que es la tuberculosis o TBC?

Es una enfermedad muy contagiosa que puede atacar cualquier órgano del cuerpo, pero principalmente los pulmones. Es causada por el microorganismo llamado Bacilo de Koch.



La tuberculosis
No se transmite
a través de los
cubiertos, la
ropa o las
sábanas, ni
al abrazar.


2 ¿Cómo se trasmite?

La tuberculosis se trasmite a través de las gotitas de saliva que viajan por el aire cuando alguien con la enfermedad tose, estornuda, escupe, habla, canta, etc.



3 ¿Cuáles son los síntomas?

- Tos con flema por más de 15 días
- Sudor nocturno
- Fiebre
- Cansancio
- Pérdida de peso
- Falta de apetito



4 ¿Cómo se diagnostica?

Toda persona con tos y flema por más de 15 días debe acudir de inmediato al establecimiento de salud, donde le realizarán un examen de flema o esputo llamado "baciloscopia".



Estos exámenes son gratuitos.

¿Cómo se previene?

- 1 Identificando oportunamente a la persona enferma de tuberculosis. Por eso si conoces a alguien con tos y flema por más de 15 días, llévalo de inmediato al Centro de Salud.



- 2 Aplicando la vacuna BCG al recién nacido.



- 3 Dando pastillas de prevención (QUIMIOPROFILAXIS) a los menores de 19 años que estén en contacto con una persona enferma de tuberculosis cuando lo indique el médico.

- 4 Participando activamente en la difusión de las actividades contra la tuberculosis en tu comunidad.

